TEXAS RACING COMMISSION
P. O. Box 12080, Austin, Texas 78711-2080
8505 Cross Park Drive, Suite 110, Austin, Texas 78754-4552
Phone (512) 833-6699 ★ Fax (512) 833-6907
www.txrc.state.tx.us

December 31, 2014

Atención: Comisión de Veterinarios, Veterinarios Practicantes, y Caballistas

Re: Niveles de Medicamentos permisibles efectivos a partir del 1 de Enero de 2015

En conformidad con la regla de la Comisión § 319.3(b)-(d), las siguientes sustancias están autorizadas si están autorizadas si están encontradas a niveles iguales o inferiores a los medicamentos especificados en muestras tomadas de un caballo después de la carrera:

THERAPEUTIC DRUG	MÁXIMO CONCENTRACIÓN PERMISIBLE
Phenylbutazone	2 mcg/ml en plasma o suero
	O, .5 mcg/ml en plasma o suero Si flunixin presente más de 3 ng/ml
Furosemide	100 ng/ml en plasma o suero y la orina especificar gravedad < 1.010
16β-hydroxystanozolol	Tolerancia cero
Boldenone	En hombres que no sean geldings - 25 pg/ml en plasma o suero
	Deberá no será permitido en las hembras o los geldings
Nandrolone	En los geldings - 25 pg/ml en plasma o suero
	En fillies y yeguas - 25 pg/ml en plasma o suero
Testosterone	En los geldings - 20 ng/ml en la orina
	En fillies y yeguas - 55 ng/ml en la orina
Acepromazine	HEPS 10 ng/ml en la orina
Albuterol	1 ng/ml en la orina
Betamethasone/Betasone	10 pg/ml de plasma o suero
Butorphanol	300 ng/ml a todo de butorphanol en la orina;
	2 ng/ml de libre butorphanol en plasma o suero
Clenbuterol/Ventipulmin	140 pg/ml en la orina
Dantrolene	100 pg/ml en plasma o suero
Detomidine	1 ng/ml de carboxydetomidine en la orina;
	límite de detección por detomodine en plasma o suero
Dexamethasone	5 pg/ml en plasma o suero
Diclofenac	5 ng/ml en plasma o suero
DMSO	10 mcg/ml en plasma o suero
Firocoxib	20 ng/ml en plasma o suero
Flunixin	20 ng/ml en plasma o suero

TEXAS RACING COMMISSION
P. O. Box 12080, Austin, Texas 78711-2080
8505 Cross Park Drive, Suite 110, Austin, Texas 78754-4552
Phone (512) 833-6699 ★ Fax (512) 833-6907
www.txrc.state.tx.us

Glycopyrrolate	3 pg/ml en plasma o suero
Isoflupredone	100 pg/ml en plasma o suero
Ketoprofen	2 ng/ml en plasma o suero
Lidocaine	20 pg/ml de todo 3-OH-lidocaine en plasma o suero
Mepivacine	3-OH-mepivacine – 10 ng/ml en la orina o mepivacine en límite de detección en plasma o suero
Methocarbamol	1 ng/ml en plasma o suero
Methylprednisolone	100 pg/ml en plasma o suero
Omeprazole	omeprazole sulfide - 1 ng/ml en la orina
Prednisolone	1 ng/ml en plasma o suero
Procaine penicillin*	25 ng/ml en plasma o suero
Triamcinolone acetonide	100 pg/ml en plasma o suero
Xylazine	10 pg/ml en plasma o suero

- Tabién se requiere:

  (1) Notificación de la administración de penicilina al secretario de carreras en el momento de entrada Y

  (2) Vigilancia obligatoria a cargo del propietario del caballo durante seis horas antes de la competencia. Coordinar con la asociación de seguridad para la prestación de vigilancia

Respectfully,
Kenneth Quirk, DVM

APPROVED:

Chuck Trout, Executive Director